

ACMELLA

CLAVE DE LAS ESPECIES

1. Papus usualmente ausente (en ocasiones con 1-3 aristas breves)

2

1'. Papus formado por 2-3 y hasta varias aristas desiguales

7

2(1). Aquenios maduros con el margen corchoso

3

2'. Aquenios maduros sin el margen corchoso

4

3(2). Flores del margen cortas o apenas excediendo a los filarios (lígulas hasta de 5 mm de largo)

A. ciliata

3'. Flores del margen excediendo notablemente a los filarios (lígulas hasta de 12 mm de largo)

A. glaberrima

4(2'). Tallos erectos o ascendentes, con raíces fibrosas fasciculadas

5

4'. Tallos decumbentes, a menudo radicantes en los nudos

6

5(4) . Flores del margen con lígulas de 4,3-5,9 mm de largo

A. psilocarpa

5'. Flores del margen con lígulas de 6-12 mm de largo

A. alpestris

6(4'). Hojas ovadas, de $0,8-9,5 \times 0,3-3$ cm; pedúnculos de 10-40 mm de largo

A. oppositifolia

6'. Hojas lineares a angostamente ovadas, de $1,3-4 \times 0,2-1$ cm; pedúnculos de 3-10 mm de largo

A. pusilla

7(1'). Flores con corola anaranjada; hojas largamente acuminadas, margen con dientes muy notables

A. serratifolia

7'. Flores con corola amarilla; hojas agudas, de margen entero, denticulado, dentado o aserrado-crenado

8

8(7'). Hojas moderado a densamente gríseo-tomentosas, especialmente en el envés

A. grisea

8'. Hojas glabras a laxamente pubescentes o esparcidamente estrigosas, a veces con algunos pelos más largos sobre las nervaduras en el envés, pero nunca gríseo-tomentosas

9

9(8'). Papus de los achenios del margen formado por varias aristas desiguales, de 0,1-0,4 mm de largo, las de los ángulos son las más desarrolladas

A. leptophylla

9'. Papus de los achenios del margen formado por 2-3 aristas desiguales, de 0,3-1,2 mm de largo

10

10(9'). Hojas elípticas, obovadas o angostamente obovadas, de $1-6 \times 0,7-2,5$ cm

A. bellidoides

10'. Hojas filiformes, lineares, linear-lanceoladas a angostamente ovadas o angostamente obovadas, de $0,9-4 \times 0,2-1,5$ cm

A. decumbens