

ANDROPOGON

CLAVE DE LAS ESPECIES

1. Inflorescencias con un racimo florífero por espateola
A. virgatus
- 1'. Inflorescencias con 2 ó más racimos floríferos por espateola
2
- 2(1'). Espiguillas pediceladas reducidas a apéndices glumiformes, estériles
3
- 2'. Espiguillas pediceladas desarrolladas, aproximadamente equilongas con las
sésiles, estaminadas (*Sec. Leptopogon*) o perfectas
(*Sec. Notosolen*)
6
- 3(2). Espiguillas sésiles múticas (o arístula menor de 1,5 mm largo)
4
- 3'. Espiguillas sésiles aristadas
7
- 4(3). Panojas numerosísimas agregadas en el ápice de las cañas formando una
inflorescencia densa, corimbosa; plantas robustas, mayores de 120 cm
A. bicornis
- 4'. Panojas no más de 30 por vara floral, más o menos agregadas en el ápice de las
cañas; plantas gráciles, menores de 100 cm
5
- 5(4'). Ápice de la lámina foliar navicular, las láminas foliares de más de 3mm de ancho;
espiguilla sésil de 3 a 4 mm de largo
A. selloanus
- 5'. Ápice de la lámina foliar acuminado, ésta de 2 mm de ancho; espiguilla sésil hasta
de 3 mm de largo
A. leucostachyus

6(2'). Racimos por espateola 4 a 8; espiguilla sésil de 4 a 5,5 mm de largo; follaje a menudo antociánico y siempre lampiño; plantas de humedales

A. macrothrix

6'. Racimos por espateola 3; espiguilla sésil de 5,5 a 6,5 mm de largo; follaje nunca antociánico, la base de la planta finamente hirsuta; plantas de arenas y suelos pedregosos

A. ternatus

7(3'). Hojas basales con láminas foliares estrechadas en la base, reduciéndose casi al nervio central; prefoliación convoluta; gluma inferior plana y sulcada con 2 a 4 nervios intracarinales; artejos y pedicelos cuneiformes, notoriamente dilatados en el ápice; espiguillas pediceladas a menudo perfectas; plantas de suelos inundables

A. exaratus

7'. Hojas basales con los márgenes de las láminas paralelos desde la base; prefoliación conduplicada; gluma inferior cóncava, sin nervios entre carenas; artejos y pedicelos filiformes; espiguillas pediceladas estaminadas, nunca perfectas

8

8(7'). Inflorescencias con 2 a 6 racimos por espateola, simples; espiguilla sésil de 5-6 mm, siempre aristada; artejos y pedicelos pilosos

A. lateralis

8'. Inflorescencias con 4 a 30 racimos por espateola, frecuentemente ramificados; espiguilla sésil de 4 a 5 mm, mútica ó brevemente aristada; artejos y pedicelos glabros a glabrescentes

A. hypogynus