

CLAVE DE LAS ESPECIES

1. Frutos con costillas primarias evidentes, brevemente aladas, no corchosas *A. graveolens*
- 1'. Frutos maduros con costillas primarias prominentes, redondeadas, corchosas, ocultando, o casi, los intervalos 2
- 2(1'). Plantas marítimas (sobre o en proximidad de la costa marítima, costeras, de litoral marítimo, etc.); hojas carnosas; carpóforo 2-fido 3
- 2'. Plantas no marítimas (de ambientes variados: cursos de agua dulce, campos húmedos, cordillera hasta 2900 m s.m.); hojas no carnosas; carpóforo entero, raro 2-fido 4
- 3(2). Plantas erectas; aromáticas; lámina foliar en hojas basales 8-15 × 3-6 cm; litoral patagónico desde Chubut al sur *A. australe*
3. Plantas prostradas; no aromáticas; lámina foliar en hojas basales 3-7 × 2-5 cm; litoral de Buenos Aires *A. prostratum*
- 4(2'). Plantas hasta de 0,6 m de alto, tallos delgados, tendidos o ascendentes; lámina de hojas basales de 3-8 × 4-6 cm (hojas incurvadas en seco) *A. commersonii*
- 4'. Plantas hasta de 1, 5 m de alto, erectas, tallo robusto (por lo menos en la porción inferior, ver aclaración en *A. sellowianum*); lámina de las hojas basales hasta de 30 cm de largo 5
- 5(4'). Bienal, tallos floríferos muy ramificados, delgados y flojos; umbelas en su mayoría sésiles. Noreste de la Argentina hasta norte de Buenos Aires *A. sellowianum*
- 5'. Perenne, tallos floríferos moderadamente ramificados y más o menos erectos; umbelas en su mayoría pedunculadas. Oeste y centro de la Argentina *A. panul*