

AXONOPUS

CLAVE DE LAS ESPECIES

1. Gluma superior y lemma inferior con nervios marcados, surcadas a levemente cóncavas entre los nervios, con el nervio medio usualmente presente, 5-7-nervias

2

1'. Gluma superior y lemma inferior con nervios no marcados, lisas, con el nervio medio ausente o excepcionalmente presente, pero no conspicuo

3

2(1). Antecio superior castaño oscuro en la madurez, 0,6-0,8 mm más corto que la gluma superior y lemma inferior

A. leptostachyus

2'. Antecio superior pajizo, de igual tamaño que la gluma superior y la lemma inferior

A. siccus

3(1'). Antecio superior castaño a la madurez

4

3'. Antecio superior pajizo a blanquecino a la madurez

5

4(3). Plantas densamente cespitosas, lateralmente comprimidas; vainas basales conspicuamente dísticas, equidistantes, de aspecto iridáceo, generalmente glaucas y con tintes violáceos

A. suffultus

4'. Plantas con rizomas delgados, estoloníferos, falciformes o rectos, cubiertos por numerosos catáfilos coriáceos; no fuertemente comprimidas lateralmente, vainas basales dispuestas alrededor de las cañas, no dísticas.

A. argentinus

5(3') Espiguillas híspidas, con pelos blanco-plateados, purpúreos o fuscentes, hasta de 2 mm de largo

A. marginatus

5'. Espiguillas glabras a esparcidamente pilosas, con pelos ralos, suaves, blanquecinos, 1,5-5,5 mm de largo

6

6(5'). Espiguillas de (3,2-)3,4-5,5 mm de largo

7

6'. Espiguillas de 1,5-2,6(-3) mm de largo

8

7(6). Racimos distanciados entre sí; láminas lanceoladas, de 1-2,3 cm de ancho

A. obtusifolius

7'. Racimos aproximados a subconjugados; láminas linear-lanceoladas, de 0,5-1 cm de ancho

A. rosengurtii

8(6'). Láminas linear-lanceoladas a lanceoladas, de 0,5-1,2 cm de ancho, de base subcordada; espiguillas ovoides, de (1,8-)2,2-2,6(-3) x 0,8-1,2 mm; antecio superior 0,4-0,8 mm más corto que la gluma superior y la lemma inferior

A. compressus

8'. Láminas lineares de 0,2-0,4(-0,5) cm de ancho, de base angosta, continuándose imperceptiblemente con la vaina; espiguillas elipsoides, de 1,5-1,8(-2) x 0,4-0,6 mm; antecio superior igual o hasta de 0,3 mm más corto que la gluma superior y la lemma inferior

A. fissifolius