

CLAVE DE LAS ESPECIES

1. Plantas anuales; hojas con el hipófilo maculado; inflorescencias parciales en racimos; brácteas involucrales coloreadas en toda su longitud; antocarpos con sulcos sinuosos

B. spicata

- 1'. Plantas perennes; hojas con el hipófilo no maculado; inflorescencias parciales en fascículos o glomérulos cimosos; brácteas involucrales coloreadas sólo en el ápice; antocarpo sin sulcos sinuosos

2

- 2(1'). Flores ca. 8 mm; tépalos hendidos, sin tricomas en la escotadura; estambres 3-6, muy exertos; nectario conspicuo, cubriendo casi totalmente el ovario; antocarpos obovoides

B. pulchella

- 2'. Flores ca. 2 mm; tépalos emarginados, con tricomas en la escotadura; estambres 1-3, levemente exertos; nectario inconspicuo, alcanzando la parte media del ovario; antocarpos claviformes u obpiramidales

3

- 3(2'). Inflorescencias en fascículos de 3-5 flores; perigonio distal sin tricomas pluricelulares; antocarpos 5-costados, ápice redondeado a cónico; rafidios dispuestos uniformemente en los valles intercostales

B. diffusa

- 3'. Inflorescencias en glomérulos de 10-30 flores; perigonio distal con tricomas pluricelulares; antocarpos 3-4-costados, ápice truncado; rafidios dispuestos en línea en los valles intercostales

B. cordobensis