CLAVE DE LAS ESPECIES

1. Hábito reptante, raíces adventicias presentes; corola de 5-7 mm de diámetro

C. parviflora

1’. Hábito erecto, decumbente o procumbente, raíces adventicias ausentes; corola mayor de 10 mm de diámetro

2

2(1’). Corola actinomorfa, hipocraterimorfa, ápice del tubo constreñido

C. pygmaea

2’. Corola zigomorfa, infundibuliforme, ápice del tubo ampliado

3

3(2’). Androceo o gineceo similares en longitud al tubo de la corola, con estambres o estigma ubicados en la boca del tubo

4

3’. Androceo y gineceo de menor longitud que el tubo de la corola, con estambres y estigma incluidos, debajo de los dos tercios de la longitud del tubo

6

4(3). Corola con limbo blanco; gineceo mayor que el androceo, con estigma ubicado adelante de las anteras no conniventes

C. longistyla

4’. Corola con limbo rosado hasta purpúreo; gineceo menor que el androceo, con anteras del par mayor de estambres conniventes y ubicadas adelante del estigma

5

5(4’). Hojas sin callosidad basal en el envés sobre el punto de inserción al tallo; estilo de ápice fuerte y cortamente curvo en forma de gancho; cápsula elipsoide, hasta de 4 mm de diámetro

C. caesia

5’. Hojas con una callosidad en la base del envés sobre el punto de inserción al tallo; estilo levemente curvo; cápsula subglobosa o elipsoide, de 7-8 mm de diámetro

C. irgangiana

6(3’). Estigma claramente 2-lobado (en forma de Y o T)

7

6’. Estigma entero, capitado, truncado o algo dilatado

8

7(6). Cáliz poco más corto o similar en longitud al tubo corolino; limbo corolino rojizo-purpúreo, garganta generalmente con un anillo violáceo delgado, tubo blanquecino; lóbulos estigmáticos algo oblicuos respecto al estilo; plantas de campos con pastizales

C. excellens

7’. Cáliz de menor longitud o poco mayor que la mitad del tubo corolino; limbo corolino rojizo-purpúreo o rosado, garganta generalmente con borde blanquecino o violáceo, tubo amarillo; lóbulos estigmáticos casi transversales respecto al estilo; plantas de bordes de selva en zonas elevadas

C. linoides subsp. *furcata*

8(6’). Limbo corolino rojizo-violáceo, purpúreo o rosado, con venación muy tenue no contrastante; envés de las hojas maduras sin callosidad sobre el punto de inserción al tallo

9

8’. Limbo corolino blanquecino, a veces con tintes rosados o violáceos, con venación contrastante purpúrea más o menos intensa; envés de las hojas maduras con una callosidad sobre el punto de inserción al tallo

10

9(8). Hábito erecto, a veces con algunas ramas basales decumbentes; hojas angostamente lineares, linear-espatuladas u oblongas, generalmente con fascículos axilares de hojitas pequeñas sobre braquiblastos; corola anchamenteinfundibuliforme o tubuloso-infundibuliforme

C. thymifolia

9’. Hábito decumbente; hojas oblongas o elípticas, fascículos axilares ausentes; corola cortamente infundibuliforme

C. missionica

10(8’). Hojas lineares, linear-espatuladas, linear-oblongas o elípticas, las maduras frecuentemente con fascículos de hojitas pequeñas en su axila; estilo de ápice curvo hasta fuertemente curvo en forma de gancho

C. humilis

10’. Hojas elípticas, ovadas, oblongas, oblanceoladas u obovadas, las maduras con fascículos de hojitas axilares escasos o ausentes; estilo de ápice levemente curvo

11

11(10’). Hojas de los brotes jóvenes erguidas; haz del limbo corolino con venación reticulada muy intensa; estigma capitado, con los lados curvados hacia el dorso, surcado transversalmente

C. pubescens

11’. Hojas de los brotes jóvenes no erguidas; haz del limbo corolino con venación reticulada muy tenue; estigma capitado-discoide

C. ovalifolia