## CLAVE DE LAS ESPECIES

1. Sépalos iguales; superficie seminal rugosa

2
1'. Sépalos desiguales, siendo 3 externos y 2 internos; superficie seminal lisa
3
2(1). Estípulas glabras; sépalos con el apéndice corniforme oblicuo y espinas lisas; pétalos ovados, 3-lobados, de menor longitud que los filamentos estaminales
C. burkartii
2'. Estípulas con tricomas en las nervaduras; sépalos con el apéndice corniforme erguido y espinas escabrosas; pétalos triangulares, agudos, de igual longitud que los filamentos estaminales
C. kurtzii
C. kurtzii 3(1'). Sépalos internos con la espina apenas más corta que la de los sépalos externos; pétalos ovados, agudos, apenas de mayor longitud que los filamentos estaminales
3(1'). Sépalos internos con la espina apenas más corta que la de los sépalos externos; pétalos
3(1'). Sépalos internos con la espina apenas más corta que la de los sépalos externos; pétalos ovados, agudos, apenas de mayor longitud que los filamentos estaminales
3(1'). Sépalos internos con la espina apenas más corta que la de los sépalos externos; pétalos ovados, agudos, apenas de mayor longitud que los filamentos estaminales  C. ramosissimum  3'. Sépalos internos con la espina muy reducida, apenas notable; pétalos escamiformes,
3(1'). Sépalos internos con la espina apenas más corta que la de los sépalos externos; pétalos ovados, agudos, apenas de mayor longitud que los filamentos estaminales  C. ramosissimum  3'. Sépalos internos con la espina muy reducida, apenas notable; pétalos escamiformes, redondeados, casi de la misma longitud que los filamentos estaminales