

## CLAVE DE LAS ESPECIES

1. Hojas mayores dispuestas en la parte basal del tallo, frecuentemente con hojas más pequeñas en la parte superior

2

1'. Hojas mayores por encima de la base del tallo, con hojas más pequeñas por debajo y en la parte superior

3

2(1). Involucro cilíndrico o estrechamente acampanado; flores 14-20; hojas agrupadas en una roseta basal densa

*C. propinqua*

2'. Involucro hemisférico o anchamente acampanado; flores 40-50; hojas distribuidas en el tercio inferior del tallo

*C. flexuosa*

3(1'). Involucro de 12-13(-20) mm de alto

*C. verbascifolia*

3'. Involucro de 4-10 mm de alto

4

4(3'). Capítulos poco numerosos, reunidos en cincinos cortos, 2-5-céfalos; hojas lineares, linear-lanceoladas u ovadolanceoladas

*C. lithospermifolia*

4'. Capítulos numerosos, agrupados en cincinos amplios, que se reúnen en inflorescencias paniculiformes; hojas obovadas, ovadas a elípticas, lanceoladas a oblongo-lanceoladas

5

5(4'). Filarios notablemente acuminados en el ápice, lanosos externamente, con pelos ondulados, enmarañados

*C. platensis*

5'. Filarios agudos, seríceos o seríceo-tomentosos en el dorso, usualmente con pelos simples, acroscópicos

6

6(5'). Lámina foliar notablemente cordada en la base; brácteas de la inflorescencia más largas que el involucre

*C. cordifolia*

6'. Lámina foliar obtusa en la base; brácteas de la inflorescencia más cortas o iguales que el involucre

*C. cognata*