

CLAVE DE LAS ESPECIES

1. Ramas, inflorescencias y lámina de las hojas con pubescencia de tricomas estrellados; cáliz tubular

2

1'. Ramas, inflorescencias y lámina de las hojas glabras o con pubescencia de tricomas simples; cáliz cupuliforme o acampanado

3

2(1). Inflorescencias generalmente bracteadas en las ramificaciones de primer orden; lámina foliar membranácea

*C. alliodora*

2'. Inflorescencias ebracteadas; lámina foliar cartácea

*C. trichotoma*

3(1'). Lámina foliar glabra en la superficie abaxial; fruto desnudo; estilo 2-partido con 4 estigmas capitados

4

3'. Lámina foliar tomentosa en la superficie abaxial; fruto cubierto totalmente por el cáliz fructífero inflado; estilo 1-partido con 2 estigmas capitados

*C. saccellia*

4(3). Lámina foliar con el ápice notoriamente atenuado y el margen entero; cáliz glabro, no acrescente en la fructificación, caedizo

*C. ecalyculata*

4'. Lámina foliar con el ápice agudo u obtuso y el margen dentado en el tercio apical; cáliz pubérulo, acrescente en la fructificación pero sin cubrir al fruto, tornándose papiráceo y con lóbulos generalmente patentes, hasta de 3 cm de largo

*C. americana*