

## DANTHONIA

### CLAVE DE LAS ESPECIES

1. Lemma con lóbulos laterales más largos que la parte indivisa  
2
- 1'. Lemma con lóbulos laterales iguales o más cortos que la parte indivisa  
3
- 2(1). Pálea obovada, 2-2,2 veces más larga que ancha; cariopsis ovoidea; arista castaña en 1/3-1/4 basal, a veces incolora  
*D. cirrata*
- 2'. Pálea elíptica, 2,7-3,6 veces más larga que ancha; cariopsis ovoidea u oblongoidea; arista negra en toda o casi toda su longitud  
*D. melanathera*
- 3(1'). Lemma completamente glabra o glabra en el dorso y pestañosa en los márgenes  
4
- 3'. Lemma pilosa en dorso y márgenes, a veces sólo en el tercio basal  
5
- 4(3). Pelos del callo largos, alcanzando la inserción de la arista dorsal  
*D. secundiflora*
- 4'. Pelos del callo cortos, nunca alcanzando la inserción de la arista dorsal  
*D. chilensis*
- 5(3'). Pelos del dorso de la lemma de 3-4,5 mm, sobrepasan la inserción de la arista dorsal  
*D. montevidensis*
- 5'. Pelos del dorso de la lemma hasta de 2,3 mm de largo  
6
- 6(5'). Pelos del dorso de la lemma alcanzan pero no sobrepasan la inserción de la arista dorsal  
*D. annableae*

6'. Pelos del dorso de la lemma ralos, en el tercio basal

*D. rugoloana*