

## CLAVE DE LAS ESPECIES

1. Pétalos sin lígula; flores diclinas; hojas sésiles; plantas rizomatosas

*F. juniperoides*

1'. Pétalos con lígula; flores perfectas o pistiladas; hojas pediceladas; plantas no rizomatosas

2

2(1'). Márgenes de las hojas planos a ligeramente revolutos, la cara abaxial de la hoja no surcada; nervio medio ocupando menos de la mitad de la superficie expuesta de la cara abaxial; hojas pubescentes y no visiblemente glandulosas en la cara adaxial

3

2'. Márgenes de las hojas moderadamente a fuertemente revolutos, la cara abaxial de la hoja profundamente surcada, ya sea por un surco abierto, divergente o uno central; nervio medio ocupando casi la totalidad de la superficie expuesta de la cara abaxial o no visible; hojas glabras y glandulosas en la cara adaxial

4

3(2). Sufrútice erecto; hojas estrechamente ovadas a triangulares, de ápice agudo a ligeramente acuminado, caducas; ramas frecuentemente terminadas en espinas divaricadas

*F. fischeri*

3'. Hierba anual; hojas obovadas, oblongas a elípticas, a veces las basales orbiculares, de ápice obtuso a retuso o ligeramente emarginado, persistentes; ramas no terminadas en espinas

*F. pulverulenta*

4(2'). Flores acompañadas de 4 brácteas connadas en la base; flores con pedúnculos de 0,2-8 mm de largo; plantas de 20-50 cm de alto, no formadoras de cojines densos

5

4'. Flores acompañadas de 2 brácteas libres y adpresas; flores sésiles; plantas de 1-15 cm de alto, formadoras de cojines densos

6

5(4). Hojas dispuestas en fascículos densos de 4-15 hojas; ramas terminadas en espina

*F. patagonica*

5'. Hojas opuestas, nunca dispuestas en fascículos; ramas no terminadas en espina

*F. chubutensis*

6(4'). Cáliz tubular; nervio medio de la hoja, triangular, visible en la cara abaxial

*F. microphylla*

6'. Cáliz turbinado a campanulado; nervio medio de la hoja, linear, no visible en la cara abaxial

*F. triandra*