

CLAVE DE LAS ESPECIES

1. Androceo heterodínamo; cáliz con 5-10 apéndices largos; inflorescencias de (2-)4-10 flores; hojas ovadas o angostamente elípticas de base atenuada; frutos con esclerosomas; arbustos

2

1'. Androceo homodínamo; cáliz con 5 (raro 8) apéndices incipientes; flores solitarias; hojas ovadas de base cordiforme; frutos sin esclerosomas; hierbas rastreras

L. asarifolia

2(1). Estambres 3+2, filamentos largos de 1,3-3 mm, los cortos de 0,5-1,8 mm; anteras de 1,9-4 mm

3

2'. Estambres 1+4, filamento largo de 5-6,8 mm, los cortos de 1,6-2 mm; anteras de 5-6 mm

L. pauciflora

3(2). Hojas subsésiles o sésiles; láminas angostamente elípticas a lineares; filamentos glabros; anteras de 1,9-2,5 mm, iguales o apenas mayores que los filamentos más largos (1,5-2,1 mm); bayas con pirenos

L. lycioides

3'. Hojas largamente pecioladas (pecíolos de 0,6-3,5 cm); láminas ovadas; filamentos pubescentes; bayas sin pirenos

4

4(3'). Corola blanca con el centro amarillo, de 7-9(-12,5) mm; anteras de 1,9-3 mm, un poco mayores que los filamentos más largos (1,2-1,8 mm); estigma 2-lobado; pedicelos de 1,8-2,5(-3,5) cm; frutos globoso-deprimidos, pequeños, de 0,7-0,9 cm de diámetro

L. fasciculata

4'. Corola violácea de 13,5-18 mm; anteras de 3-4 mm, bastante mayores que los filamentos más largos (2,2-3 mm); estigma discoide; pedicelos de 1,2-1,6 cm; frutos globoso-comprimidos, grandes, de 2-3,5 cm de diámetro

L. rantonnetii