

## MULGURAEA

### CLAVE DE LAS ESPECIES

1. Plantas con hojas homomorfas, generalmente sin desarrollo de braquiblastos 2
- 1'. Plantas con hojas dimorfas, con desarrollo de braquiblastos 3
- 2(1). Corola de 9-13 mm de largo, pubescente en la fauce; hojas de 2-8(-15) mm de largo; clusas no aladas; las plantas ennegresen al secarse
- M. scoparia*
- 2'. Corola de 10-16 mm de largo, glabra en la fauce; hojas de 1-5 cm de largo; clusas aladas; las plantas no se ennegresen al secarse
- M. ligustrina*
- 3(1'). Hojas de los macroblastos espiniformes, si inermes siempre punzantes al envejecer; hojas de los braquiblastos con lámina reducida o no; monobotrios formados por espigas contraídas hasta de 3 cm de largo; corola pubescente en la fauce 4
- 3'. Hojas de los macroblastos inermes, nunca punzantes; hojas de los braquiblastos con lámina desarrollada; monobotrios o dibotrios formados por espigas mayores de 3 cm de largo; corola glabra en la fauce 8
- 4(3). Hojas de los macroblastos enteras; cáliz 4-dentado, 4-costado; corola con pelos moniliformes en la fauce
- M. tetragonocalyx*
- 4'. Hojas de los macroblastos 3-lobadas a 3-sectadas; cáliz 5-dentado, 5-costado; corola con pelos claviformes en la fauce 5

5(4'). Brácteas florales 3-lobadas; clusas pubescentes en el ápice

*M. tridens*

5'. Brácteas florales enteras; clusas glabras en el ápice

6

6(5'). Cáliz campanulado con dientes triangulares, agudos

*M. cedroides*

6'. Cáliz tubuloso con dientes subulados, punzantes

7

7(6'). Hojas de los braquiblastos enteras, con lámina desarrollada, obovadas a linear-oblongas, a veces con un diminuto mucrón

*M. asparagoides*

7'. Hojas de los braquiblastos 3-partidas, con lámina reducida, carnosas

*M. hystrix*

8(3'). Dientes del cáliz subulados, de 1-2,5 mm de largo

*M. aspera*

8'. Dientes del cáliz triangulares, subiguales, de ápice rígido, de 0,5 mm de largo

*M. echegarayi*