

NICORAEPOA

CLAVE DE LAS ESPECIES

1. Plantas perfectas con anteras fértiles de 2-3 mm de largo; plantas con rizomas largos y delgados

N. subnervis

1'. Plantas ginodioicas, las flores perfectas con anteras fértiles de 3-4 mm de largo y las pistiladas con estaminodios grandes, de 1-3 mm de largo; plantas con rizomas cortos o largos, generalmente engrosados

2

2(1'). Lemma lisa, no escabrosa, los nervios desvanecidos, la quilla y los nervios laterales pilosos, escabrosos o glabros.

3

2'. Lemma escabrosa con los nervios muy marcados, los marginales normalmente escabrosos o glabros, la quilla pilosa o glabra.

6

3(2). Vainas notablemente dilatadas, de longitud variable, formando un césped no uniforme; panoja densa, espiciforme, exerta o incluida entre las hojas.

N. robusta

3'. Vainas imbricadas muy apretadas entre sí y alcanzando aproximadamente la misma altura, dando origen a un césped bajo, de altura uniforme, del que emergen aisladas las panojas

4

4(3'). Callo de los antecios glabro, ocasionalmente con una corona de pelos; hojas más o menos blandas, a menudo planas; plantas aisladas o formando cojines o manchones

N. pugionifolia

4'. Callo de los antecios con pelos cortos y rígidos de 0,5 mm de largo o menores, abundantes o escasos; hojas tiesas, rígidas y punzantes; plantas a menudo formando cojines duros

5

5(4'). Cañas floríferas de 7-13 cm de alto; hojas subuladas de 1,5-2,5 cm de largo, menores de 1 mm de diámetro; panoja linear muy simple, apenas ramificada en su base, normalmente con 1-2 espiguillas por cada nudo del eje. Chubut

N. erinacea

5'. Cañas floríferas de 50-70 cm de alto; láminas conduplicadas, las basales hasta de 11 cm x 3,5-6 mm; panoja laxiúscula de 6,5-15 cm de largo, con ramas basales, a veces extendidas, de 2,5-9 cm de largo, excediendo notablemente al césped. Estepa de Mendoza, Neuquén y Río Negro

N. stepparia

6(2'). Lemma aristulada o mucronado-aristulada, a menudo con 2 lóbulos diminutos en el ápice entre los cuales emerge la arista o mucrón; glumas normalmente mayores que los antecios contiguos

N. andina

6'. Lemma con el ápice agudo o acuminado, nunca con lóbulos pequeños en el mismo; glumas normalmente menores que los antecios contiguos

N. chonotica