

CLAVE DE LAS ESPECIES

1. Involucelo conspicuo, 2-4 brácteas de 2,5-9,5 mm de largo, extendidas o reflejas. Noroeste a centro de Argentina hasta el extremo sur de las Sierras Pampeanas (en Córdoba y San Luis)

*O. mexicana*

1'. Involucelo ausente o, raramente, con 1-2 brácteas diminutas, hasta de 2,5 mm de largo. Especies andino patagónicas desde Mendoza a Tierra del Fuego

2

2(1'). Frutos linear-fusiformes con apéndices basales rudimentarios o ausentes, glabros o escasamente hispídos sobre las costillas y hacia la base; últimos segmentos peciolulados pinnatipartidos a laciniados en el medio distal, más o menos pinnatisectos hacia abajo

*O. glabrata*

2'. Frutos linear-oblongos o claviformes con apéndices caudados de 2-10 mm de largo, moderada a densamente hispídos en las costillas y particularmente hacia la base; últimos segmentos peciolulados, groseramente serrados en el medio distal y ± pinnatipartidos hacia abajo

3

3(2'). Umbelas fructíferas con radios y pedicelos ascendentes o extendido-ascendentes, pedicelos menores que el largo del fruto; frutos de 15-18 mm de largo

*O. berteroi*

3'. Umbelas fructíferas con radios y pedicelos fuertemente divergentes hasta reflejos, pedicelos iguales o, generalmente, mayores que el largo del fruto; frutos de 10-16 mm de largo

*O. depauperata*