

CLAVE DE LAS ESPECIES

1. Plantas erectas o decumbentes

2

1'. Plantas volubles, ocasionalmente suberectas con ramas flexuosas (*O. barberoanum*)

28

2(1). Láminas foliares menos de 2 cm de largo, ovadas a lanceoladas

3

2'. Láminas foliares más de 2 cm de largo, cuando menores nunca ovadas ni lanceoladas

6

3(2). Plantas decumbentes; lóbulos del cáliz hasta de 1,8 mm de largo; lóbulos de la corola hasta de 3 mm de largo

O. microphyllum

3'. Plantas erectas; lóbulos del cáliz nunca menores a 2 mm de largo; lóbulos de la corola de más de 4 mm de largo

4

4(3'). Piezas de la corona con lóbulos agudos, recurvos; cabeza estilar inclusa

O. humile

4'. Piezas de la corona con lóbulos tortuosos en la cara ventral, falcados en la cara dorsal; cabeza estilar exerta

5

5(4'). Apéndice de la cabeza estilar con segmentos ca. 4 mm de largo; caudículas con espesamientos oscuros sólo arriba de la inserción de los polinios

O. argentinum

5'. Apéndice de la cabeza estilar con segmentos menores a 0,5 mm de largo, diminutos; caudículas con espesamientos oscuros en toda su longitud

	<i>O. radinsii</i>
6(2'). Caudículas edentadas	7
6'. Caudículas dentadas	10
7(6). Hojas lineares; plantas palustres	<i>O. corymbosum</i>
7'. Hojas de otro tipo, pero nunca lineares; plantas no palustres	8
8(7'). Tubo de la corola globoso	<i>O. globosum</i>
8'. Tubo de la corola de otro tipo, pero nunca globoso	9
9(8'). Inflorescencias multifloras, compactas; caudículas horizontales	<i>O. commersonianum</i>
9'. Inflorescencias paucifloras, laxas; caudículas oblicuas	<i>O. coccineum</i>
10(6'). Piezas de la corona con apéndice ventral (lígula)	11
10'. Piezas de la corona sin lígula	12
11(10). Apéndice de la cabeza estilar exerto, dividido hacia el ápice en dos anchos lóbulos 3-lobados; lígula de la corona más corta que los lóbulos laterales	<i>O. joergensenii</i>

11'. Apéndice de la cabeza estilar incluso, oculto por las anteras, ramas indivisas; lígula de la corona más larga que los lóbulos laterales

O. incanum

12(10'). Piezas de la corona 4-lobadas, dos laterales y dos apicales

13

12'. Piezas de la corona enteras o diversamente 2-lobadas

14

13(12). Inflorescencias paucifloras; corola con el tubo reflexo, mostrando la inserción de la corona; retináculo linear.

O. venustum

13'. Inflorescencias densifloras, corola con el tubo no reflexo, inserción de la corona inclusa; retináculo obovado

O. fontellae

14(12'). Piezas de la corona enteras o apenas emarginadas, nunca 2-lobadas

15

14'. Piezas de la corona más o menos profundamente 2-lobadas

16

15(14). Apéndice de la cabeza estilar ruminado, largamente exerto

O. teyucuaense

15'. Apéndice de la cabeza estilar liso, subincluso

O. arnottianum

16(14'). Hojas lineares, hasta de 5 mm de ancho

17

16'. Hojas no lineares, si lineares de más de 5 mm de ancho

17(16). Lóbulos de la corola patentes o erectos; piezas de la corona partidas hasta más debajo de la parte media

18

17'. Lóbulos de la corola reflexos; piezas de la corona partidas hasta ca. la mitad o más arriba

20

18(17). Lóbulos de la corola con margen subrevoluto, algo retorcidos en el ápice; corona con el ápice exerto

O. schulzii

18'. Lóbulos de la corola completamente revolutos y retorcidos; corona totalmente incluida

19

19(18'). Apéndice de la cabeza estilar cilíndrico, igual o subigual en altura a las piezas de la corona

O. lynchianum

19'. Apéndice de la cabeza estilar ovoide, notablemente más corto que las piezas de la corona.

O. chodatianum

20(17'). Hojas hasta de 1 mm de ancho; retináculo breve, apenas excediendo el ancho de las caudículas

O. gracile

20'. Hojas de más de 1 mm de ancho; retináculo mucho más largo que el ancho de las caudículas

21

21(20'). Apéndice de la cabeza estilar terminado en dos filamentos, generalmente divergentes

- O. arenicola*
- 21'. Apéndice de la cabeza estilar cónico, breve
- O. hilarianum*
- 22(16'). Apéndice de la cabeza estilar exerto por sobre la corona
- 23
- 22'. Apéndice de la cabeza estilar incluso bajo la corona
- 26
- 23(22). Apéndice de la cabeza estilar con el ápice grueso
- O. capitatum*
- 23'. Apéndice de la cabeza estilar con el ápice o con ramas filiformes
- 24
- 24(23'). Retináculo notablemente más largo que los polinios
- O. solanoides*
- 24'. Retináculo más corto que los polinios
- 25
- 25(24'). Corola con lóbulos lanceolados a linear-lanceolados, de 5-7 × 1,5 mm; apéndice de la cabeza estilar dividido en el ápice en dos lóbulos generalmente conniventes
- O. crispum*
- 25'. Corola con lóbulos filiformes retorcidos, de 10-12 × 1 mm; apéndice de la cabeza estilar dividido en ramas divergentes
- O. parviflorum*
- 26(22'). Segmentos de la corona partidos hasta cerca de la base
- O. subcapitatum*
- 26'. Segmentos de la corona partidos en el ápice

27(26'). Retináculo del mismo largo que los polinios

O. charrua

27'. Retináculo notablemente más largo que los polinios

O. confusum

28(1'). Retináculo con un apéndice membranáceo en el ápice

O. appendiculatum

28'. Retináculo sin un apéndice membranáceo en el ápice

29

29(28'). Apéndice de la cabeza estilar dividido en más de 2 lóbulos anchos, lineales o subulados

30

29'. Apéndice de la cabeza estilar 2-fido, 2-lobado o ausente

36

30(29). Corola con lóbulos triangulares de menos de 5 mm de largo

O. tucumanense

30'. Corola con lóbulos de más de 5 mm de largo

31

31(30'). Apéndice de la cabeza estilar dividido en dos ramas 3-fidas

O. guaraniticum

31'. Apéndice de la cabeza estilar dividido en 5-7 ramas filiformes

32

32(31'). Lóbulos de la corola de 1,5 cm o más largos

O. mosenii

- 32'. Lóbulos de la corola menos de 1,5 cm de largo
33
- 33(32'). Retináculo visiblemente más corto que los polinios
O. fiebrigii
- 33'. Retináculo más largo que los polinios
34
- 34(33'). Retináculo de 0,4 mm de largo, apenas más largo que los polinios
O. pubescens
- 34'. Retináculo notablemente más largo que los polinios
35
- 35(34'). Hojas de 4,6 cm de ancho, base profundamente cordada; pecíolo de 2-3 cm de largo
O. longipedunculatum
- 35'. Hojas hasta de 3 cm de ancho, base no profundamente cordada; pecíolo excepcionalmente hasta de 2 cm de largo
O. sylvestre
- 36(29'). Apéndice de la cabeza estilar ausente
O. megapotamicum
- 36'. Apéndice de la cabeza estilar presente
37
- 37(36'). Caudículas edentadas
38
- 37'. Caudículas dentadas
41
- 38(37). Corola con tubo cilíndrico

38'. Corola con tubo campanulado

40

39(38). Lóbulos de la corola de 2 cm de largo

O. barberoanum

39'. Lóbulos de la corola más cortos de 2 cm de largo

O. erianthum

40(38'). Hojas ovado-lanceoladas; apéndice de la cabeza estilar con filamentos retorcidos en el ápice

O. brachystemma

40'. Hojas oblongo-lanceoladas, apéndice de la cabeza estilar con filamentos no retorcidos

O. macrolepis

41(37'). Corona incluida en el tubo de la corola, no visible, caudículas con dientes incluidos

42

41'. Corona exerta, caudículas con dientes prominentes

43

42(41). Lóbulos de la corola reflexos, hasta de 6 mm de largo

O. ostenii

42'. Lóbulos de la corola erectos, de más de 1 cm de largo

O. stipatum

43(41'). Piezas de la corona con apéndice ventral (lígula)

O. molle

43'. Piezas de la corona sin lígula

44

44(43'). Apéndice de la cabeza estilar craso, trunco, con el ápice levemente hendido

O. sublanatum

44'. Apéndice de la cabeza estilar 2-fido

45

45(44'). Pubescencia lanosa en tallos, cara abaxial de las hojas y frutos

O. pannosum

45'. Plantas sin pubescencia lanosa en las partes indicadas del dilema anterior

46

46(45'). Corona inclusa en al menos dos tercios en el tubo corolino; frutos corrugados

O. wightianum

46'. Corona exerta del tubo corolino, a excepción de su base; frutos lisos, longitudinalmente acanalados

O. balansae