

PAPPOPHORUM

CLAVE DE LAS ESPECIES

1. Panojas con frecuencia amplias, rara vez subespiciformes; espiguillas (3-)4(-5)-
floras, sólo el antecio basal perfecto; conjunto de antecios generalmente menores de 1
mm de ancho; lemma con 11-15 aristas

P. pappiferum

1'. Panojas subespiciformes, contraídas, con las ramificaciones próximas al eje
principal; espiguillas 4-6-floras, con (1-)2-4 antecios perfectos; conjunto de antecios
generalmente mayores de 1 mm de ancho; lemma con más de 15 aristas

2

2(1'). Superficie interna del cuerpo de la lemma escabrosa o ligeramente escabrosa en
su región superior

3

2. Superficie interna del cuerpo de la lemma pubescente o densamente pubescente en
su región superior

5

3(2). Glumas mayores de 8 mm de largo; pálea de 4,3-5 mm de largo

P. macrospermum

3'. Glumas iguales o menores de 7 mm de largo; pálea de 2-4 mm de largo

4

4(3'). Espiguillas usualmente menores de 7,5 mm de largo, a veces hasta 8 mm, con
1-2 antecios perfectos; cuerpo de la lemma de 1,5-2,2(-2,5) mm de largo; aristas de 3-
5 mm de largo

P. caespitosum

4'. Espiguillas mayores de 8 mm de largo, con 2(-3) antecios perfectos; cuerpo de la
lemma de 2,5-3(-3,2) mm de largo; aristas de (5-)6-9 mm de largo

P. vaginatum

5(2'). Plantas de 5-50 cm de alto; panoja de 4-15 cm de largo; espiguillas con 2-4 antecios fértiles; cuerpo de la lemma de 2,5-4 mm de largo; pálea de (3-)3,5-5 mm de largo; antecios normalmente pilosos, a veces cortamente pubescentes

P. philippianum

5'. Plantas de 40-120 cm de alto; panoja de (15-)20-40 cm de largo; espiguillas con 1-2 antecios fértiles; cuerpo de la lemma de (1,8-)2-2,5(-3) mm de largo; pálea de 2-3,3 mm de largo; antecios cortamente pubescentes

P. krapovickasii