

## PHALARIS

### CLAVE DE LAS ESPECIES

1. Panojas con grupos de 5-8 espiguillas estériles y 1 espiguilla fértil central, que caen conjuntamente en la madurez; antecios basales de la espiguilla fértil reducidos a dos escudetes callosos con 2 ciliias apicales

2

1'. Panojas con todas las espiguillas fértiles; antecios basales rudimentarios callosos en la base y generalmente prolongados en una laminita coriácea o membranosa, no 2-ciliados en el ápice

3

2(1). Plantas perennes, con las bases de las cañas bulbiformes; panojas exertas

*P. coerulescens*

2'. Plantas anuales; panoja semi-incluida en la vaina foliar superior inflada

*P. paradoxa*

3(1'). Antecios fértiles con un antecio rudimentario basal reducido a un escudete calloso y el otro más desarrollado, con escudete calloso y laminita coriácea

4

3'. Antecios fértiles con los dos antecios rudimentarios basales constituidos por un escudete calloso prolongado en una laminita

5

4(3). Plantas perennes; alas de las glumas con el borde entero; raicillas con el ápice blanco-amarillento

*P. aquatica*

4'. Plantas anuales; alas de las glumas con el borde denticulado; raicillas con el ápice rojizo

*P. minor*

5(3'). Plantas perennes, rizomatosas; panoja abierta en su sector basal

*P. arundinacea*

5'. Plantas anuales; panoja espiciforme

6

6(5'). Antecio fértil de 5-7,5 mm de largo, con los antecios basales lanceolados, llegando a  $\frac{1}{2}$  de la lemma fértil; panoja ovoide

*P. canariensis*

6'. Antecio fértil hasta de 3 mm de largo, con los antecios basales lineares no sobrepasando  $\frac{1}{3}$  de la lemma fértil; panoja angostamente cilíndrica

7

7(6'). Antecio fértil agudo, casi totalmente pubescente; lámina foliar lisa en la cara superior

*P. angusta*

7'. Antecio fértil acuminado, glabro en el  $\frac{1}{4}$  superior; lámina foliar estriada en la cara superior

*P. platensis*