

CLAVE DE LAS ESPECIES

1. Plantas perennes con raíces gemíferas y rizomas, por lo general con abundantes tricomas ramificados; tubo corolino con ancho anillo interno de tricomas exclusivamente ramificados, desde la inserción de los estambres al borde basal del limbo; anteras de 2,5-4 mm; bayas anaranjadas; cáliz fructífero 10-costado

P. viscosa

1'. Plantas anuales, con indumento variado, excepcionalmente con tricomas ramificados; tubo corolino con un delgado anillo interno de tricomas simples, ramificados y glandulares en el borde superior del tubo; anteras de 0,8-2,6 mm; bayas verdes o cremosas; cáliz fructífero 5-10-costado

2

2(1'). Cáliz y corola equilongos; lóbulos calicinos laciniados, de (2,5-)3,5-5,5 mm; pedicelos de (6-)13-25(-30) mm en la flor y de 15-33 mm en el fruto; cáliz fructífero 5-costado, persistente, de (30-)35-60 mm; bayas maduras verdes y pilosas

P. pruinosa

2'. Cáliz $\frac{1}{2}$ a $\frac{3}{4}$ la longitud de la corola; lóbulos calicinos triangulares o deltoides, de (0,75-)1-3,5 mm; pedicelos de 2,5-10 mm en la flor y de 4-17 mm en el fruto; cáliz fructífero 5- ó 10-costado, generalmente caduco, de 10-40 mm; bayas maduras color crema o verdosas, glabras o pilosas

3

3(2'). Corola de (3-)4-7 mm, levemente maculada; anteras amarillas, de 0,5-1,5 mm; pedicelos de 2-5 mm; cáliz fructífero de 10-25 mm, pubescente; bayas glabras

4

3'. Corola de (6-)7-12 mm, con 5 máculas violetas o pardas; anteras violáceas o amarillas, de 1,5-2,5 mm; pedicelos de 5-12(-18) mm; cáliz fructífero de 22-40 mm, pubescente o glabro; bayas glabras o pilosas

5

4(3). Plantas glabrescentes, sólo pubescentes en la base del tallo y en el cáliz, donde presentan tricomas con base prominente, pluricelular (cojín); corola 5-lobada, carente de lóbulos comisurales; cáliz ca. $\frac{3}{4}$ de la longitud de la corola, con lóbulos deltoides y obtusos; hojas de margen entero o levemente dentado; bayas verdosas

P. lagascae

4'. Plantas densamente pubescentes, con tricomas sin base prominente; corola 10-lobada, con 5 lóbulos comisurales profundamente emarginados; cáliz ca. $\frac{1}{2}$ de la longitud de la corola, con lóbulos triangulares y agudos; hojas de borde dentado; bayas cremosas

P. subilsiana

5(3'). Plantas glabras o aparentemente glabras, con escasos tricomas simples, curvos y antrorsos; bayas glabras

6

5'. Plantas densamente glanduloso-pubescentes, tallos con tricomas glandulares y eglandulares, sin tricomas antrorsos; bayas pilosas

P. pubescens

6(5). Plantas con escasos tricomas antrorsos; tallos fistulosos; hojas con borde dentado-anguloso; cáliz fructífero glabro o con escasos pelos, 10-costado; corola con máculas violetas

P. angulata

6'. Plantas con tricomas hasta de 0,7 mm; tallos macizos; hojas con borde festoneado y escasamente dentado; cáliz fructífero piloso, 5-costado; corola sin máculas

P. victoriana