

## CLAVE DE LAS ESPECIES

1. Arbustos escandentes, espinosos, corteza violácea, ramas laterales delgadas, ramificadas en 90°, con espinas curvas (raro inermes); flores estaminadas con los lóbulos del cáliz reflexos; flores pistiladas sin estaminodios, disco basal alrededor del ovario; antocarpio, 4-5-angulado, con 4-5 hileras completas de glándulas desde la base hasta el ápice; glándulas capitadas, 1-2 seriadas

*P. aculeata*

- 1'. Árboles inermes, corteza grisácea, ramas laterales carnosas o delgadas, ramificadas en 45° o más; flores estaminadas con lóbulos del cáliz poco o nada reflexos; flores pistiladas con estaminodios (a veces reducidos a un disco lobado); antocarpio 5-10-angulado, cada ángulo con una hilera longitudinal uniseriada de glándulas capitadas o no, dispuestas en los 2/3 superiores

2

- 2(1'). Inflorescencias en cimas corimbiformes laxas, de 2,5-8 cm de largo; antocarpos 5-angulados, con 5 hileras longitudinales casi completas de glándulas 1-2 seriadas en los ángulos, el tercio inferior del antocarpio sin glándulas (raro con 1-3 menores); glándulas de base alargada, retrorsas, el ápice curvo, no capitadas; láminas elípticas elíptico-orbiculares, a veces obovadas o sub-rómbicas, de (4-)9-16(-25) × (2-)4-7(-13) cm

*P. ambigua*

- 2'. Inflorescencia en cimas capitadas densas, compactas, de 0,9-2 cm largo; antocarpos 10-angulados, con 10 hileras incompletas e iguales de glándulas uniseriadas desde el ½ hasta el ápice; glándulas erectas, capitado-pediceladas, pedicelo ensanchado en la base, mucilaginoso entre los pedicelos; láminas

frecuentemente fasciculadas en braquiblastos, opuestas o subopuestas en macroblastos, elípticas, orbiculares, a obovado-orbiculares, de (3-)4-6(-9) × 2-4(-6) cm

*P. zapallo*