

## RORIPPA

### CLAVE DE LAS ESPECIES

1. Pétalos ausentes, muy rara vez presentes, hasta la mitad de la longitud de los sépalos; semillas  
1-seriadas  
*R. dubia*
- 1'. Pétalos siempre presentes, iguales o más largos, rara vez más cortos que los sépalos; semillas  
2-seriadas  
2
- 2(1'). Sépalos persistentes después de la maduración de los frutos  
*R. nana*
- 2'. Sépalos caducos poco después de la antesis  
3
- 3(2'). Frutos ovoides, elipsoides u oblongoides  
4
- 3'. Frutos lineares a linear-oblongoides  
5
- 4(3). Hojas 2-pinnatisectas; tallos postrados, pétalos blanco-cremosos, de 0,7-1,5 mm de largo  
*R. austroamericana*
- 4'. Hojas liradas a pinnatisectas o dentadas; tallos erectos, pétalos amarillos, de (1,5)1,8-2,5(-3)  
mm de largo  
*R. palustris*
- 5(3'). Pétalos amarillos, de 2,8-6 mm de largo; frutos ocasionalmente desarrollados  
*R. sylvestris*
- 5'. Pétalos blancos, de 1,5-3,5 mm de largo; frutos siempre desarrollados  
6
- 6(5'). Estilo de 1-3 mm de largo; frutos teretes o subteretes  
7
- 6'. Estilo de 0,05-0,6(-0,8) mm de largo; frutos ligera a fuertemente aplanados

7(6). Tallos de 15-40 cm de alto; pétalos de 1,5-2 mm de largo; óvulos 90-140; semillas de 0,5-0,6 mm de largo

*R. clandestina*

7'. Tallos de 50-160 cm de alto; pétalos de 2,5-3,3 mm de largo; óvulos 60-100; semillas de 0,9-1,2 mm de largo

*R. hilariana*

8(6'). Plantas perennes; frutos de (1,7-)2-2,7 cm de largo; pecíolos de las hojas basales y caulinares inferiores de 5-12 cm de largo

*R. coxii*

8'. Plantas anuales; frutos de 0,6-2 cm de largo; pecíolos de las hojas basales y caulinares inferiores de 0,5-4(-5) cm de largo

9(8'). Plantas completamente papilosas; lóbulos laterales de las hojas basales y caulinares inferiores peciolulados

*R. burkartii*

9'. Plantas glabras, rara vez con unas pocas papilas sobre las aurículas; lóbulos de las hojas laterales no peciolulados

10(9'). Semillas amarillas, coliculadas; tallos a menudo decumbentes, usualmente varios desde la base; hojas caulinares no auriculadas o diminutamente auriculadas; óvulos 40-60(-76)

*R. philippiana*

10'. Semillas castañas o castaño-rojizas, diminutamente reticuladas; tallos a menudo erectos, usualmente simples desde la base; hojas caulinares auriculadas a amplexicaules; óvulos (50-)60-180

11(10'). Hojas pinnatisectas, lóbulos laterales filiformes o lineares a linear-oblongos; semillas apiculadas o aladas distalmente

*R. bonariensis*

11'. Hojas pinnatífidas, lóbulos laterales oblongos a ovados o elípticos; semillas no apiculadas o aladas distalmente

*R. mandonii*