

CLAVE DE LAS ESPECIES

1. Hojas en verticilos o raramente opuestas 2
- 1'. Hojas alternas 3
- 2(1). Hojas en verticilos de 3(-4) o raramente opuestas; láminas de las hojas superiores ovado-lanceoladas; tubo de la corola rojo con lóbulos amarillo-verdosos. Especie distribuida en las Yungas del noroeste argentino 3  
*S. orbignianus*
- 2'. Hojas en verticilos de 6-8; láminas de las hojas superiores sublinear-oblongas; corola rojo-anaranjada. Especie distribuida en la selva Paranaense del noreste argentino 3  
*S. verticillatus*
- 3(1'). Hojas superiores elíptico-lanceoladas; corola completamente amarilla 3  
*S. fiebrigii*
- 3'. Hojas superiores ovadas, ovado-lanceoladas, oblongo-lanceoladas o linear-lanceoladas; corola anaranjada o roja, cuando roja con o sin los lóbulos amarillo-verdosos 4
- 4(3'). Hojas oblongo-lanceoladas, linear-lanceoladas u ovado-lanceoladas, dispuestas de manera compacta a medianamente laxa; flores dispuestas en racimos terminales; corola roja o anaranjada, nunca con los lóbulos amarillo-verdosos 5
- 4'. Hojas ovadas, distribuidas de manera laxa; flores solitarias en las axilas de las hojas superiores; corola de tubo rojo con lóbulos amarillo-verdosos 6
- 5(4). Hojas superiores generalmente oblongo-lanceoladas o linear-lanceoladas; corola roja 6  
*S. foliosus*
- 5'. Hojas superiores generalmente ovado-lanceoladas; corola anaranjada 6  
*S. nemoralis*
- 6(4'). Hojas de base redondeada a oblicua; pedúnculos ebracteolados. Especie distribuida en las Yungas del noroeste argentino 6  
*S. argentinus*
- 6'. Hojas de base cordada a truncada; pedúnculos 2-bracteolados. Especie distribuida en la selva Paranaense del noreste argentino 6  
*S. yerbalensis*