

SISYMBRIUM

CLAVE DE LAS ESPECIES

1. Racimos completamente bracteados; flores a menudo en fascículos
- S. runcinatum*
- 1'. Racimos ebracteados; flores no en fascículos
- 2
- 2(1'). Frutos subulado-lineares, de (0,7-)1-1,4(-1,8) cm de largo, adpresos
- S. officinale*
- 2'. Frutos angostamente lineares, de (2-)3-14 cm de largo, no adpresos
- 3
- 3(2'). Pedicelos fructíferos más angostos que el fruto
- 4
- 3'. Pedicelos fructíferos casi tan anchos como el fruto maduro
- 5
- 4(3). Los frutos inmaduros no sobrepasan a las flores ni los botones florales; pétalos de 6,5-8 mm de largo
- S. austriacum*
- 4'. Los frutos inmaduros sobrepasan a las flores y botones florales; pétalos de 2,5-4 mm de largo
- S. irio*
- 5(3'). Hojas superiores pinnatisectas, con lóbulos lineares o filiformes; sépalos cuculados; pedicelos fructíferos de (4-)6-10(-13) mm de largo
- S. altissimum*
- 5'. Hojas superiores simples o hastadas, no divididas en segmentos lineales; sépalos no cuculados; pedicelos fructíferos de 1-6 mm de largo
- 6
- 6(5'). Pedicelos fructíferos de 1-2(-3) mm de largo; pétalos de 1,4-2,5 mm de largo; semillas 30-46(-54) por fruto
- S. erysimoides*

6'. Pedicelos fructíferos de 3-6 mm de largo; pétalos de (6-)7-9(-10) mm de largo; semillas (60-
)80-100(-140) por fruto

S. orientale