

CLAVE DE LAS ESPECIES

1. Semillas rodeadas por un ala profundamente lacerada o dividida en apéndices cintiformes de 0,3-0,6 mm de ancho

*S. depauperata*

1'. Semillas rodeadas de un ala entera, sinuada o dentada-fimbriada, pero nunca lacerada en apéndices cintiformes o alas ausentes

2

2(1'). Inflorescencias 1(-2)-floras, pseudoterminal. Especie sólo coleccionada en la cordillera del norte de San Juan

*S. pissisii*

2'. Inflorescencias con 2 o más flores agrupadas en cimas dicotómicas o en cincinos

3

3(2'). Semillas con ala de 0,1-0,7 mm de ancho

4

3'. Semillas sin alas

9

4(3). Ala de la semilla entera o sinuada

*S. ramosa*

4'. Ala de la semilla dentado-fimbriada

5

5(4'). Sépalos glabros

6

5'. Sépalos glanduloso-pubescentes o glabrescentes con algunos tricomas en la base

8

6. Márgenes de los sépalos generalmente teñidos de púrpura

*S. villosa*

6'. Márgenes de los sépalos no teñidos de púrpura

7

7(6'). Estípulas lanceoladas, de 3,5-7 mm de largo, connadas ca. 1/3 de su longitud, enteras; flores blancas

*S. levis*

7'. Estípulas triangulares, de 1,5-3 mm de largo, connadas desde la mitad o más arriba de su longitud, generalmente dentadas; pétalos blancos en la base y rosados en el ápice, raramente blancos por completo

*S. marina*

8(5'). Semillas castaño-claras

*S. marina*

8'. Semillas pardo-oscuras, casi negras

*S. villosa*

9(3'). Sépalos completamente glabros

10

9'. Sépalos glanduloso-pubescentes o glabrescentes con algunos tricomas en la base

11

10(9). Plantas erectas o decumbentes; hojas no fasciculadas o con 1-2 hojas axilares por nudo; inflorescencias en cimas dicotómicas difusas, densas

*S. platensis*

10'. Plantas generalmente cespitosas; hojas generalmente fasciculadas; inflorescencias en cimas dicotómicas laxas

*S. villosa*

11(9'). Plantas perennes de base leñosa

12

11'. Plantas anuales o bienales

13

12(11). Semillas con tubérculos verruciformes o claviformes en el dorso y de color más pálido que la testa

*S. marina*

12'. Semillas densamente papilosas, con papilas de la misma tonalidad que la testa

*S. villosa*

13(11'). Semillas no marginadas; brácteas de la inflorescencia reducidas, escariosas; pedicelo fructífero hasta ca. 3 veces el largo del cáliz

*S. diandra*

13'. Semillas marginadas; brácteas de la inflorescencia herbáceas; pedicelo fructífero hasta 1-1,5 veces el largo del cáliz

14

14(13'). Cápsulas de (3-)4-6(-6,5) mm de largo; semillas de (0,5-)0,6-0,7(-0,8) mm de diámetro

*S. marina*

14'. Capsulas de 2-4 mm de largo, semillas de 0,4-0,6 mm de diámetro

*S. bocconeii*