

## CLAVE DE LAS ESPECIES

1. Flores ligeramente zigomorfas; corola generalmente lilacina o rosada; estambres fijos en la base del tubo corolino; fruto subgloboso, asimétrico, con un carpelo indehiscente y otro dehiscente, con tres lóbulos calicinos persistentes, indumento de pelos más largos y densos en el carpelo indehiscente

*S. confusa*

1'. Flores actinomorfas; corola blanca; estambres fijos cerca del seno interlobular; fruto subturbinado, subgloboso o elipsoide, simétrico, con ambos carpelos dehiscentes, indehiscente o tardíamente separado en el ápice en dos carpelos indehiscentes, generalmente con dos lóbulos calicinos cada uno

2

2(1'). Planta palustre; fruto indehiscente o separado tardíamente en el ápice en dos mericarpos indehiscentes, comprimido en sentido vertical al tabique intercarpelar, glabro; inflorescencias en glomérulos 1-laterales

*S. riparia*

2'. Plantas no palustres (excepto *S. prostrata*); fruto con ambos carpelos dehiscentes, pubescentes; inflorescencia en glomérulos rodeando al eje de la inflorescencia, con ejes floríferos simples o ramificados en dicotomía o pseudodicotomía

3

3(2'). Corola hasta de 1,5 mm de largo, igual o más corta que el cáliz, superficie interna con escasos pelos en los lóbulos; semillas con notables foveas 6-gonales (foveas ca. 100  $\mu\text{m}$ )

*S. prostrata*

3'. Corola hasta de 3,5 mm de largo, de mayor longitud que el cáliz, superficie interna con pelos en los lóbulos y dispersos en el tubo; semillas con foveas inconspicuas

4

4(3'). Hojas de 4-12  $\times$  1-2,5 mm, subcoriáceas; inflorescencias en ejes floríferos simples o rara vez divididos dicotómicamente en el ápice, glomérulos terminales de mayor tamaño que el resto, brácteas iguales o levemente más largas que los glomérulos

*S. ostenii*

4'. Hojas de 13-75  $\times$  1,5-26 mm, cartáceas; inflorescencias en ejes floríferos dicotómicos o pseudodicotómicos, glomérulos más o menos iguales entre sí, brácteas 2 a 5 veces más largas que los glomérulos

5

5(4'). Hojas oblongas o elípticas, de 15-75 × 5-26 mm, con 5-6 pares de nervios secundarios conspicuos, base atenuada, pseudopecioladas; corola externamente pubescente, internamente con un anillo de pelos en la base de los lóbulos y escasos pelos ralos en la base del tubo

*S. affinis*

5'. Hojas lineares o angostamente elípticas, de 13-23 × 1,5-5 mm, con los nervios secundarios inconspicuos, de base aguda, sésiles o pseudopecioladas; corola externamente glabra o papilosa, con una franja densa de pelos en la mitad inferior de los lóbulos y un anillo de pelos en la base del tubo

*S. eryngioides*