

## CLAVE DE LAS ESPECIES

1. Pappus formado por pajitas muy cortas o bien por pajitas y 1-5 (6-7) aristas más largas  
2
- 1'. Pappus formado por numerosas aristas (comúnmente más de 7) tan largas o más que la corola, al menos en los adelfocarpos  
21
- 2(1). Capítulos con pedúnculos tan largos o más que el involucro, agrupados primariamente en cimas corimbiformes laxas  
3
- 2'. Capítulos sésiles o casi sésiles (pedúnculos más cortos que el involucro), agrupados primariamente en cimas glomeriformes  
6
- 3(2). Hojas lineares, linear-lanceoladas o lanceoladas, de 1-7 mm de ancho  
4
- 3'. Hojas anchamente lanceoladas u ovado-lanceoladas, de 6-30 mm de ancho  
5
- 4(3). Pappus con 1-5 aristas  
*S. fiebrigii*
- 4'. Pappus con 6-8 aristas  
*S. carapariensis*
- 5(3'). Hojas anchamente lanceoladas de 0,6-2 cm de ancho, cortamente pecioladas  
*S. yalae*

5°. Hojas ovado-lanceoladas de 2-3 cm de ancho, atenuadas en pseudopecíolo alado hasta de 1,5 cm de largo	
	<i>S. yaconensis</i>
6(2'). Hojas ovadas u ovado-rómbicas	7
6°. Hojas elípticas, oblanceoladas o lanceoladas	15
7(6). Hojas de 0,8-3,5 × 0,7-1,5 cm	
	<i>S. chamaedrys</i>
7°. Hojas de 3-17 × (1-)2-8 cm	8
8(7'). Hojas (al menos las inferiores) acorazonadas en la base, con pecíolo no alado	9
8°. Hojas sésiles o contraídas en un pseudopecíolo alado	10
9(8). Cimas glomeriformes agrupadas en una panoja terminal	
	<i>S. sanguinea</i>
9°. Cimas glomeriformes agrupadas de a 3 en dicasios en los extremos de las ramitas	
	<i>S. lilloi</i>
10(8'). Hojas muy grandes, de 9-17 cm de largo	11
10°. Hojas menores	12
11(10). Plantas laxamente pubescentes o glabras; involucre casi glabro	
	<i>S. alpina</i>

- 11'. Plantas densamente pubescentes; involucro pubescente  
*S. crassicephala*
- 12(10'). Hojas sésiles o subsésiles  
*S. centinelae*
- 12'. Hojas contraídas en un corto pecíolo  
13
- 13(12'). Hojas casi tan largas como anchas  
*S. camachensis*
- 13'. Hojas por lo menos 2 veces más largas que anchas  
14
- 14(13'). Hojas pubescentes en ambas caras  
*S. vaga*
- 14'. Hojas ligeramente pubérulas o glabrescentes en la haz y pubescentes sobre las  
nervaduras en el envés  
*S. breviaristata*
- 15(6'). Hojas elípticas, de 2-7 mm de ancho  
16
- 15'. Hojas lanceoladas u oblanceoladas de 5-20 mm de ancho  
17
- 16(15). Involucro de 12-14 mm de alto  
*S. gilliesii*
- 16'. Involucro de 6-8 mm de alto  
*S. minor*
- 17(15'). Hojas oblanceoladas; aristas del papus siempre 3  
*S. okadae*

17'. Hojas lanceoladas; aristas del papus 1-4	18
18(17'). Hojas glabras a ligeramente pubérulas	19
18'. Hojas más o menos pubescentes	20
19(18). Hojas uniformemente atenuadas en la base; aristas del papus 2-4, casi tan largas como la corola	
	<i>S. procumbens</i>
19'. Hojas contraídas en pseudopecíolo; papus con 1-2 escamas aristiformes	
	<i>S. potrerensis</i>
20(18'). Hojas de 4-7 cm de largo; papus con 1-4 aristas de longitud variable	
	<i>S. achalensis</i>
20'. Hojas de 9-15 cm de largo; papus con 1-2 aristas de 1,5 mm de largo	
	<i>S. jujuyensis</i>
21(1'). Capítulos con pedúnculos tan largos o más que el involucro agrupados primariamente en cimas corimbiformes laxas	22
21'. Capítulos sésiles o casi sésiles (pedúnculos más cortos que el involucro) agrupados primariamente en cimas glomeriformes	29
22(21). Hojas estrechamente oblongas o linear-lanceoladas	23
22'. Hojas de otras formas	24

- 23(22). Papus formado por 12-15 aristas; hojas hasta de 3,5 cm de largo; corolas blancas o blanco- liláceas  
*S. selloi*
- 23'. Papus formado por 18-25 aristas; hojas hasta de 5 cm de largo; corolas purpúreas  
*S. multiaristata*
- 24(22'). Hojas oblanceoladas, agudas o semiobtusas en el ápice  
25
- 24'. Hojas lanceoladas u ovado-elípticas  
27
- 25(24). Hojas pubescentes, al menos en los bordes  
*S. entleriensis*
- 25'. Hojas glabras o casi glabras, punteado-glandulosas  
26
- 26(25'). Hojas enteras u oscuramente crenuladas en la parte superior; aristas 20-24  
*S. burkartii*
- 26'. Hojas crenado-aserradas; aristas 15-20  
*S. lundiana*
- 27(24). Involucro de 6-7 mm de alto  
28
- 27'. Involucro de (6-7-)11-13 mm de alto  
*S. cinerascens*
- 28(27). Papus formado por 6-7 aristas  
*S. schreiteri*
- 28'. Papus formado por 11-15 aristas  
*S. villaricensis*

- 29(21'). Hojas lineares u oblanceoladas a estrechamente lanceoladas  
30
- 29'. Hojas ovado-rómbicas, ovadas o elíptico-lanceoladas  
32
- 30(29). Hojas hasta de 6 cm de largo; papus formado por 7-13 aristas  
*S. mercedensis*
- 30'. Hojas hasta de 3,3 cm de largo; papus formado por 12-20 aristas  
31
- 31(30'). Tallos ramosos; glomérulos agrupados en cimas corimbiformes amplias; papus  
con aristas de igual longitud  
*S. satureiifolia*
- 31'. Tallos ramosos sólo en la inflorescencia; glomérulos agrupados en cimas  
corimbiformes contraídas; papus con aristas desiguales en longitud  
*S. maimarensis*
- 32(29'). Hojas de 4-7 cm de largo; tallos erectos de 50-80 cm de alto; aristas del papus  
15-20  
*S. aristata*
- 32'. Hojas de 1-2 cm de largo; tallos ascendentes o decumbentes de 10-20 cm de alto;  
aristas del papus 13-15  
*S. tarijensis*